

باسم‌هه تعالی

سؤالات امتحان نهایی درس : شیمی ۳

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

نام و نام خانوادگی :

رشته : ریاضی و فیزیک - علوم تجربی

ساعت شروع: ۸ صبح

تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۲۰

تعداد صفحه: ۴


پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

دانش آموزان روزانه ، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۸  
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی

<http://aee.medu.ir>

۱/۲۵	<p>در هر مورد از بین دو واژه داده شده ، واژه مناسب را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>آ) کوارتز از جمله نمونه های خالص و ماسه از جمله نمونه های ناخالص «<u>سیلیسیم</u>» است.</p> <p>ب) الماس، جزو جامد های کووالانسی با چینش «<u>دو بعدی سه بعدی</u>» است.</p> <p>پ) پژوهشگران در خودروهای دیزلی از گاز <math>\frac{NH_3}{NO}</math> برای حذف آلاینده ها استفاده می کنند.</p> <p>ت) سلول دانز نوعی سلول «<u>گالوانی الکترولیتی</u>» است.</p> <p>ث) برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده به آن ها نمک های «<u>کلر</u>» می افزایند.</p>	۱												
۲/۲۵	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>آ) از مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید برای باز کردن مجاری مسدود شده در دستگاه های صنعتی استفاده می شود.</p> <p>ب) گرافیت تک لایه ای از گرافن است ، که در آن اتم های کربن با پیوندهای اشتراکی ، حلقه های شش گوشه تشکیل داده اند.</p> <p>پ) جسمی که آبکاری می شود به قطب مثبت باتری اتصال دارد.</p> <p>ت) در ساخت پروانه کشتی های اقیانوس پیما ، به جای تینتانیم از فولاد استفاده می کنند.</p> <p>ث) در سلول برقکافت آب ، کاغذ pH در پیرامون آن ، به رنگ آبی در می آید.</p>	۲												
۱	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>شیر</th> <th>کات کبود در آب</th> <th>شربت معده</th> <th>مخلوط ویژگی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ناهمگن</td> <td>...(ب)...</td> <td>...(T)...</td> <td>همگن یا ناهمگن</td> </tr> <tr> <td>نور را پخش می کند</td> <td>نور را پخش ... (پ).....</td> <td>نور را پخش ... (ت).....</td> <td>رفتار در برابر نور</td> </tr> </tbody> </table> <p>با توجه به مواد داده شده ، جدول زیر را کامل کنید.</p>	شیر	کات کبود در آب	شربت معده	مخلوط ویژگی	ناهمگن	...(ب)...	...(T)...	همگن یا ناهمگن	نور را پخش می کند	نور را پخش ... (پ).....	نور را پخش ... (ت).....	رفتار در برابر نور	۳
شیر	کات کبود در آب	شربت معده	مخلوط ویژگی											
ناهمگن	...(ب)...	...(T)...	همگن یا ناهمگن											
نور را پخش می کند	نور را پخش ... (پ).....	نور را پخش ... (ت).....	رفتار در برابر نور											
۱/۲۵	<p>شکل های زیر محلول سه اسید تک پروتون دار « HA . HB و HC » را در دما و غلظت یکسان در یک لیتر آب نشان می دهد. (هر ذره را یک مول از آن گونه در نظر بگیرید).</p> <p>آ) کدام محلول رسانایی الکتریکی بیشتری دارد؟ چرا؟</p> <p>ب) در صد یونش HA را محاسبه کنید.</p> <p>پ) کمترین ثابت یونش مربوط به کدام اسید است؟</p>	۴												

با توجه به ساختار پاک کننده داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.






(آ) این ترکیب پاک کننده صابونی است یا پاک کننده غیرصابونی؟ چرا؟

(ب) چربی به کدام بخش از پاک کننده می‌چسبد؟ چرا؟ (۱، ۲ یا ۳)

(پ) آیا این نوع پاک کننده در آب‌های سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می‌کند؟


با توجه به واکنش‌های شیمیایی داده شده به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.



(آ) نقش «Pt» در واکنش «a» چیست؟

(ب) در واکنش‌های بالا نام یا فرمول شیمیایی فرآورده‌های تولید شده را به جای (۱)، (۲) و (۳) بنویسید.

(پ) عدد اکسایش کربن ستاره دار را در واکنش «d» تعیین کنید.



شکل زیر بخشی از یک ورقه آهنی را نشان می‌دهد که از فلز (s) M(s) پوشیده شده است.

(آ) فلز M یک از فلزهای مس (Cu) یا منیزیم (Mg) می‌تواند باشد؟ چرا؟

(ب) نیم واکنش موازن‌شده کاهش را بنویسید.


$$E^\circ(Mg^{2+}/Mg) = -2/37 \text{ V}$$

$$E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0/44 \text{ V}$$

$$E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0/34 \text{ V}$$

۸

با توجه به شکل رویه رو، که طرحی از یک سلول گالوانی «روی - نیکل» را نشان می دهد به پرسش های زیر پاسخ دهید.



$$E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \quad E^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0.23$$

- (آ) کدام الکترود نقش کاتد دارد؟  
 ب) در شکل مقابله کدام مورد «۱» یا «۲» جهت حرکت آنیون ها را نشان می دهد؟  
 پ) در واکنش کلی سلول، ذره کاهنده را مشخص کنید.  
 ت) نیروی الکتروموموتوری (emf) سلول را محاسبه کنید.

با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید:


(آ) کدامیک از حروف «A»، «B» یا «C» آنتالپی واکنش را نشان می دهد؟

(ب) در حضور کاتالیزگر کدام یک از قسمت های «C» یا «B»، «A» تغییر می کند؟ چرا؟

(پ) این نمودار به کدامیک از فرایندهای زیر مربوط است؟ چرا؟


(انحلال آمونیوم نیترات - سوختن کربن مونوکسید)

۹



با توجه به نقشه پتانسیل مولکول های شکل (۱) و (۲) به سوالات پاسخ دهید.

(آ) کدام شکل (۱) یا (۲) نشان دهنده مولکول «NH₃» است؟



(پ) مولکول شکل (۲) قطبی است یا ناقطبی؟ چرا؟

(پ) در شکل (۱) به جای A از کدام علامت « $\delta^+$ » یا « $\delta^-$ » می توان استفاده کرد؟ چرا؟

۱۰

با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.

(آ) چگالی بار یون  $F^-$  بیشتر است یا یون  $Cl^-$ ؟ چرا؟

(پ) آنتالپی فروپاشی شبکه منیزیم اکسید ( $MgO$ ) بیشتر است

یا سدیم اکسید ( $Na_2O$ )؟ چرا؟

(پ) با توجه به داده های جدول کدام ترکیب کمترین نقطه

ذوب را دارد؟

۱۱

شعاع (pm)	آنیون	شعاع (pm)	کاتیون
۱۳۳	$F^-$	۶۶	$Mg^{2+}$
۱۴۰	$O^{2-}$	۹۷	$Na^+$
۱۸۱	$Cl^-$	۱۳۳/۳	$K^+$

۱	<p>اگر غلظت تعادلی استیک اسید برابر <math>0.02 \text{ مولار}</math> و ثابت تعادل آن <math>K_a = 1.8 \times 10^{-5}</math> باشد غلظت یون هیدرونیوم را در محلول بدست آورید.</p> $\text{CH}_3\text{COOH(aq)} \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$	۱۲
۱/۲۵	<p>شکل زیر نوعی سلول سوختی هیدروژن - اکسیژن را نشان می دهد.      آ) به جای «A، B و C» واژه های توصیفی یا نماد شیمیایی مناسب قرار دهید؟      ب) یک تفاوت سلول سوختی و باتری را بنویسید.      پ) یکی از چالش هایی که در کاربرد سلول های سوختی خودنما می کند را بنویسید.</p>	۱۳
۱/۵	<p>مطابق واکنش زیر <math>0.1 \text{ مول}</math> سدیم اکسید را در مقداری آب حل کرده و حجم محلول را به <math>100 \text{ میلی لیتر}</math> می رسانیم .</p> $\text{Na}_2\text{O(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{Na}^+(\text{aq}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})$ <p>آ) غلظت یون هیدروکسید را در محلول بدست آورید.      ب) pH محلول چقدر است? (<math>\log 2 = 0.3</math>)</p>	۱۴
۱/۷۵	<p>با توجه به سامانه تعادلی زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.</p> $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \quad \Delta H = -92 \text{ kJ.mol}^{-1}$ <p>آ) با کاهش دما در فشار ثابت، درصد مولی آمونیاک در سامانه چه تغییری می کند؟ چرا؟      ب) با افزایش حجم در واکنش فوق تعداد مول های گاز هیدروژن چه تغییری می کند؟ چرا؟      پ) اگر در دمای معین، ثابت تعادل واکنش فوق <math>8 \times 10^{-3}</math> باشد، میزان پیشرفت واکنش در این دما کم است، یا زیاد؟ چرا؟</p>	۱۵
۲۰	جمع نمره	« موفق باشید »

۱/۲۵	(آ) سیلیس(۰/۲۵) (ص ۶۸) ت) الکتروولیتی(۰/۲۵) (ص ۵۵) ث) فسفات(۰/۲۵) (ص ۱۲) ب) سه بعدی (۰/۲۵) (ص ۷۰) پ) NH <sub>۴</sub> (۰/۲۵) (ص ۹۹)	۱
۲/۲۵	آ) درست (۰/۲۵) (ص ۱۳)  ب) نادرست (۰/۲۵) <u>گرافن</u> تک لایه ای از <u>گرافیت</u> است، که در آن اتم های کربن با پیوندهای اشتراکی، حلقه های شش گوش تشکیل داده اند. (۰/۲۵) (ص ۷۰)  پ) نادرست (۰/۲۵) جسمی که آبکاری می شود به <u>قطب منفی</u> باتری اتصال دارد. (۰/۲۵) (ص ۶۰ تا ص ۶۲)  ت) نادرست (۰/۲۵) در ساخت پروانه کشتی های اقیانوس پیما، به جای <u>فولاد از تیتانیم</u> استفاده می کنند. (۰/۲۵) (ص ۸۵)  ث) نادرست (۰/۲۵) در سلول برقکافت آب، کاغذ <b>pH</b> در پیرامون آند به رنگ <u>سرخ</u> در می آید. (۰/۲۵) (ص ۵۴)	۲
۱	آ) ناهمنگ(۰/۲۵) ب) همگن (۰/۲۵) پ) نور را پخش نمی کند(۰/۲۵) ت) نور را پخش می کند (۰/۲۵) (ص ۷)	۳
۱/۲۵	آ) HB (۰/۲۵) چون کاملاً یونیده شده است (۰/۲۵) (ص ۱۷ تا ص ۱۸)  پ) $\frac{\text{شمار مولکول های یونیده شده}}{\text{شمار کل مولکول های حل شده}} \times 100 = \frac{2}{4} \times 100 = \frac{50\%}{25}$	۴
۱/۲۵	آ) غیر صابونی (۰/۲۵) زیرا دارای گروه سولفونات (SO <sub>۳</sub> <sup>-</sup> ) می باشد. (۰/۲۵) ب) بخش ۳ (۰/۲۵) زیرا چربی ناقطبی است پس به بخش ناقطبی پاک کننده می چسبد. (۰/۲۵) پ) بله پاک کنندگی خود را حفظ می کند. (۰/۲۵) (ص ۱۱)	۵

۱/۲۵	<p>آ) کاتالیزگر (۰/۲۵)</p> <p>ب) (۱) : اتیلن گلیکول یا (۰/۲۵) (ص ۱۱۶)</p> <p>(۲) : اتیل استات یا (۰/۲۵) (ص ۱۱۲)</p> <p>(۳) : ترفتالیک اسید یا (۰/۲۵) (ص ۱۱۵)</p> <p>پ) ۳ - (۰/۲۵) (ص ۶۳)</p>	۶
۰/۷۵	<p>آ) منیزیم (۰/۰) با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد منیزیم که نسبت به آهن منفی تر است. (۰/۲۵) هنگامی که خراسی پدید آمده فلز منیزیم اکسایش یافته و آهن حفاظت شده است. (۰/۲۵)</p> <p>ب)</p> $O_2(g) + 4H_2O(l) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$ <p>(ص ۵۹)</p>	۷
۱/۲۵	<p>آ) نیکل (۰/۰) ب) ۲ (۰/۰) پ) ۲ (۰/۰) ت) ۵۳ (۰/۰) (ص ۴۵)</p> <p>emf = -۰/۲۳ - (-۰/۷۶) = ۰/۵۳</p>	۸
۰/۲۵	<p>آ) C (۰/۰) (ص ۹۷)</p> <p>ب) B (۰/۰) زیرا کاتالیزگرانرژی فعال سازی را کاهش می دهد. (۰/۰) (ص ۹۶)</p> <p>پ) سوختن کربن مونواکسید (۰/۰) زیرا نمودار مربوط به یک واکنش گرماده است. (۰/۰) (ص ۹۷)</p>	۹
۰/۷۵	<p>آ) شکل ۱ (۰/۰) ب) ناقطبی (۰/۰) زیرا توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی آن متقارن است.</p> <p>پ) F<sup>-</sup> (۰/۰) زیرا در نقشه پتانسیل رنگ سرخ ، تراکم بیشتر الکترون را نشان می دهد. (۰/۰) - (اگر دانش آموز علامت هریک از رنگهای سرخ یا آبی را درست توضیح داده باشد نمره تعلق می گیرد) (ص ۷۵)</p>	۱۰
۰/۵	<p>آ) Cl<sup>-</sup> &lt; F<sup>-</sup> (۰/۰) زیرا شاعع F<sup>-</sup> نسبت به Cl<sup>-</sup> کمتر است. (۰/۰)</p> <p>ب) MgO (۰/۰) زیرا بار الکتریکی کاتیون آن بیشتر است. (۰/۰)</p> <p>پ) KCl (۰/۰) (ص ۷۸ تا ص ۷۹)</p>	۱۱

۱	$K = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} \rightarrow [CH_3COO^-] = [H^+] \rightarrow 1/8 \times 10^{-5} = \frac{[H^+]}{0.02}$ $\rightarrow [H^+] = 6 \times 10^{-4} mol.L^{-1}$	۱۲ (۱۹ ص)
۰/۷۵	A: اکسیژن (۰/۲۵)      B: هیدروژن (۰/۲۵)      C: غشای مبادله کننده پروتون (۰/۲۵)	۱۳
۰/۲۵	ب) سلول های سوختی برخلاف باتری ها انرژی شیمیایی را ذخیره نمی کنند. (۰/۲۵)	
۰/۲۵	پ) تامین سوخت آن ها است. (۰/۲۵)      (ص ۵۱ تا ۵۳)	
۱/۵	$mol OH^- = 0.01 mol Na_2O \left( \frac{1 mol OH^-}{1 mol Na_2O} \right) = 0.02 mol (0/25)$ $[OH^-] = 1 ml \times \left( \frac{0.02 mol}{1 ml} \right) = 0.02 mol.L^{-1} (0/25)$ <p style="text-align: right;">(ب)</p> $10^{-14} = [H^+][OH^-] \rightarrow 0.02[H^+] = 10^{-14} \rightarrow [H^+] = 0.05 \times 10^{-13}$ $PH = -\log[H^+] = -\log \frac{1}{0.02} = 13/3$ <p style="text-align: right;">(ص ۲۴)</p>	۱۴
۱/۷۵	آ) افزایش می یابد. (۰/۲۵) زیرا طبق اصل لوشاچلیه واکنش در جهت رفت پیش می رود. ب) با افزایش حجم (کاهش فشار) واکنش در جهت شمار مول های گازی بیشتر پیش می رود. (۰/۲۵) پس واکنش در جهت برگشت انجام می شود (۰/۲۵) و در تعادل جدید تعداد مول های گاز هیدروژن افزایش می یابد. (۰/۲۵) پ) کم (۰/۲۵) چون ثابت تعادل آن کوچک است. (۰/۲۵)	۱۵
۲۰	جمع نمره خسته نباشد.	