

# تست های کنکوری شیمی دهم فصل اول

## تست ۱ – سراسری تجربی داخل ۱۳۹۵

یک مول گاز کلر شامل ۲۰ درصد جرمی  $^{35}_{17}\text{Cl}$  و ۸۰ درصد جرمی  $^{37}_{17}\text{Cl}$  است. چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر ۳۰ لیتر باشد، چند  $\text{g.L}^{-1}$  است؟ (عدد جرمی را به تقریب، برابر اتم گرم هر ایزوتوپ در نظر بگیرید) (با کمی تغییر)

۲/۴۴ (۲)

۱/۱۸ (۱)

۱/۲۲ (۴)

۱/۳۵ (۳)

## تست ۲ – سراسری تجربی داخل ۱۳۹۵

اگر عنصر  $A$  با عنصر  $X$  از گروه ۱۵ جدول تناوبی هم‌دوره باشد، عنصر  $A$  در کدام گروه جدول تناوبی جای دارد و عدد اتمی عنصر  $X$  کدام است؟

(۲) سیزدهم، ۳۳

(۱) سیزدهم، ۳۱

(۴) چهاردهم، ۳۳

(۳) چهاردهم، ۳۱

### تست ۳ – سراسری تجربی خاچ ۱۳۹۵

عنصر  $A$  دارای سه ایزوتوپ  $^{84}A$ ،  $^{86}A$  و  $^{88}A$  است. اگر درصد فراوانی سبک‌ترین ایزوتوپ آن ۲۰٪ و جرم اتمی میانگین  $A$  برابر  $86/4$  باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟ (عدد جرمی را به تقریب معادل جرم یک مول از هر ایزوتوپ در نظر بگیرید)

(۱) ۶۰ ، ۲۰





(۲) ۴۰ ، ۴۰

(۳) ۳۰ ، ۵۰

(۴) ۲۰ ، ۶۰

## تست ۴ – سراسری تجربی خاچ ۱۳۹۵

در کدام گزینه، آرایش الکترونی کاتیون و آنیون در هر دو ترکیب، مشابه آرایش الکترونی اتم گاز نجیب دوره سوم جدول تناوبی است؟ (عدد اتمی سدیم، منیزیم، گوگرد، کلر، کلسیم و برم به ترتیب برابر ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۳۵ است)



## تست ۵ – سراسری تجربی داخل ۱۳۹۷

کدام سه عنصر در زیرلایه p بالاترین لایه اشغال شده اتم خود، الکترون ندارند؟

(۲)  ${}^{39}\text{G}$ ,  ${}^{31}\text{Z}$ ,  ${}^{27}\text{A}$

(۱)  ${}^{39}\text{G}$ ,  ${}^{30}\text{X}$ ,  ${}^{27}\text{A}$

(۴)  ${}^{36}\text{E}$ ,  ${}^{31}\text{Z}$ ,  ${}^{21}\text{M}$

(۳)  ${}^{36}\text{E}$ ,  ${}^{30}\text{X}$ ,  ${}^{21}\text{M}$

## تست ۶ – سراسری تجربی داخل ۱۳۹۸

کدام موارد از مطالب زیر، درست‌اند؟

الف) طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز، کوتاه‌تر است.

ب) انرژی هر رنگ نور مرئی، با طول موج آن نسبت مستقیم دارد.

پ) نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، ناشی از انتقال الکترون‌ها از لایه‌های بالاتر به لایه  $n = ۲$  است.

ت) هرچه فاصله میان لایه‌های انتقال الکترون در اتم برانگیخته هیدروژن بیشتر باشد، طول موج نور، بلندتر است.

۱) ب - پ - ت

۲) ب - ت

۳) الف - ب - پ

۴) الف - پ

## تست ۷ - سراسری تجربی داخل ۱۳۹۸

نسبت شمار نوترون‌ها به شمار پروتون در سنگین‌ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، کدام است؟

۲ (۲)


۱ (۱)

۷ (۴)

۳ (۳)

تست ۸ - سراسری تجربی داخل ۱۳۹۸

باتوجه به جایگاه عنصر X در جدول دوره‌ای (شکل زیر)، کدام عبارت دربارهٔ آن درست است؟




- ۱) در لایه ظرفیت اتم آن، دو الکترون وجود دارد.
- ۲) اکسید آن، درصد جرمی بالایی در خاک رس دارد.
- ۳) چگالی و نقطه ذوب آن از عنصرهای هم‌دوره خود، بالاتر است.
- ۴) به دلیل ویژگی‌های خاص، آلیاژ آن در ساخت استنت برای رگ‌ها به کار می‌رود.

## تست ۹ - سراسری تجربی داخل ۱۳۹۸

اگر دایره‌های تیره‌رنگ در شکل زیر، نشان‌دهنده لایه‌های الکترونی اتم عنصر  $A$  باشد، چندمورد از مطالب زیر، درباره آن درست است؟

- $A$  عنصری اصلی از گروه ۱۵ است.
- برخی از ترکیب‌های آن، رنگی هستند.
- بالاترین عدد اکسایش آن برابر  $+۷$  است.
- سه زیر لایه از لایه سوم آن از الکترون اشغال شده است.



۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

## تست ۱۰ – سراسری تجربی داخل ۱۳۹۸

چند مورد از مطالب زیر، درباره  $^{99}_{43}\text{Tc}$  درست‌اند؟

- در تصویربرداری از غده تیروئید، کاربرد دارد.
- نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته‌ای ساخته شد.
- اندازه یون آن درست به اندازه یون  $\text{U}^{4+}$  است و در تیروئید جذب می‌شود.
- زمان ماندگاری آن اندک است و نمی‌توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

## تست ۱۱ - سراسری تجربی داخل ۱۳۹۹

- چند مورد از مطالب زیر، دربارهٔ عنصرهای  $X_{۲۰}$  و  $Z_{۳۰}$  جدول تناوبی درست است؟
- شمار الکترون‌های لایهٔ سوم اتم هر دو عنصر، برابر است.
  - یون‌های  $X^{۲+}$  و  $Z^{۲+}$ ، آرایش الکترونی اتم گازهای نجیب را دارند.
  - هر دو عنصر، تنها با عدد اکسایش  $+۲$ ، در ترکیب‌های خود شرکت دارند.
  - $X_{۲۰}$  یک فلز از گروه ۲ و  $Z_{۳۰}$ ، آخرین عنصر واسطهٔ دورهٔ چهارم است.
  - همهٔ زیرلایه‌های اشغال‌شده در یون پایدار آن‌ها، از الکترون پر شده است.

(۲) ۳

(۱) ۲

(۴) ۵

(۳) ۴

## تست ۱۲ – سراسری تجربی داخل ۱۳۹۹

A یک عنصر از گروه ۱ جدول تناوبی و D عنصری با عدد اتمی ۱۲ است. دربارهٔ جامدهای یونی حاصل از واکنش هریک از این دو عنصر با نافلز X، در مقایسه با جامد یونی  $\text{LiF}$ ، چند مطلب زیر درست است؟ (آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلور را هم‌ارز با انرژی شبکهٔ بلور در نظر بگیرید)

- آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلور D با X، بیشتر از آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلور  $\text{LiF}$  است.
- آنتالپی فروپاشی جامد بلوری AX، برابر یا کمتر از آنتالپی فروپاشی شبکهٔ بلور  $\text{LiF}$  است.
- اگر اتم X در لایهٔ ظرفیت خود، ۶ الکترون داشته باشد، نقطهٔ ذوب بلور A با X از نقطهٔ ذوب بلور  $\text{LiF}$  پایین‌تر است.
- اگر به جای D در شبکهٔ بلور D با X، یون کلسیم جایگزین شود، آنتالپی فروپاشی آن به آنتالپی فروپاشی  $\text{LiF}$  نزدیک می‌شود.

(۲) ۲

(۱) ۱

(۴) ۴

(۳) ۳

## تست ۱۳ – سراسری تجربی داخل ۱۳۹۹

باتوجه به جدول زیر، داده‌های کدام ردیف‌های آن، درست است؟

| ردیف | ویژگی‌ها                                              | ${}_{29}^{65}\text{Z}$ | ${}_{22}^{48}\text{X}$ | ${}_{24}^{52}\text{D}$ | ${}_{31}^{70}\text{A}$ |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ۱    | شماره گروه عنصر در جدول تناوبی                        | ۱۱                     | ۴                      | ۸                      | ۱۳                     |
| ۲    | تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها                     | ۷                      | ۴                      | ۴                      | ۸                      |
| ۳    | نسبت شمار الکترون‌های دارای $l = 0$ به $l = 2$ در اتم | $0/7$                  | ۴                      | $1/4$                  | $0/6$                  |
| ۴    | اکسید با بالاترین عدد اکسایش                          | ZO                     | $\text{XO}_2$          | $\text{DO}_3$          | $\text{A}_2\text{O}_3$ |

(۱) ۴، ۲

(۲) ۲، ۱

(۳) ۳، ۲، ۱

(۴) ۴، ۳، ۲

## تست ۱۴ – سراسری تجربی داخل ۱۳۹۹

عنصر  $A$  دارای چهار ایزوتوپ با عدد جرمی ۴۹، ۵۱، ۵۳ و ۵۴ است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول ۶۵ و فراوانی ایزوتوپ سوم ۱۵ درصد باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟ (عدد جرمی ایزوتوپ‌ها، برابر با جرم اتمی آن‌ها و جرم اتمی میانگین برای عنصر  $A$ ، برابر با  $50/95 \text{ amu}$  فرض شود)

(۱)  $29/5$  ،  $35/5$

(۲)  $17/5$  ،  $47/5$

(۳)  $15$  ،  $50$

(۴)  $14/5$  ،  $50/5$

## تست ۱۵ – سراسری تجربی داخل ۱۳۹۹

کدام مطلب درست است؟

- (۱) با دور شدن الکترون از هسته، انرژی آن کاهش می‌یابد.
- (۲) در همه اتم‌ها، تراز انرژی  $n = 1$ ، حالت پایه به شمار می‌آید.
- (۳) در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، کمترین مقدار انرژی به نوار زردرنگ مربوط است.
- (۴) الکترون در حالت برانگیخته، ناپایدار است و با ازدست‌دادن انرژی، همواره به حالت پایه بازمی‌گردد.

## تست ۱۶ – سراسری تجربی خارج ۱۳۹۹

منیزیم طبیعی دارای سه ایزوتوپ  $^{24}\text{Mg}$  با جرم اتمی  $23/99 \text{ amu}$  و فراوانی ۷۹ درصد،  $^{25}\text{Mg}$  با جرم اتمی  $24/99 \text{ amu}$  و فراوانی ۱۰ درصد،  $^{26}\text{Mg}$  با جرم اتمی  $25/98 \text{ amu}$  و فراوانی ۱۱ درصد و فلوئور تنها به صورت  $^{19}\text{F}$  با جرم اتمی  $18/99 \text{ amu}$  وجود دارد. جرم مولی منیزیم فلوئورید طبیعی برابر با چند گرم است؟

(۱) ۶۱/۸۶

(۲) ۶۲/۲۸

(۳) ۶۴/۱۲

(۴) ۶۶/۴۵

## تست ۱۷ - سراسری تجربی خاچ ۱۳۹۹

در اتم کدام عنصر، شمار الکترون‌های دارای عدد کوانتومی  $l = 1$ ، برابر با مجموع شمار الکترون‌های دارای عددهای کوانتومی  $l = 0$  و  $l = 2$  است و شمار الکترون‌های ظرفیتی این عنصر، با شمار الکترون‌های لایه ظرفیت اتم کدام عنصر، برابر است؟  
(گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید)

$${}_{14}\text{D}, {}_{24}\text{M} \quad (2)$$

$${}_{16}\text{X}, {}_{24}\text{M} \quad (1)$$

$${}_{16}\text{X}, {}_{28}\text{A} \quad (4)$$

$${}_{14}\text{D}, {}_{28}\text{A} \quad (3)$$

## تست ۱۸ – سراسری تجربی داخل ۱۴۰۰

باتوجه به داده‌های جدول زیر که به عنصرهای دورهٔ چهارم جدول تناوبی مربوط است، کدام مطلب درست می‌باشد؟

| M    | E     | D    | A     | عنصرها<br>_____                                                         |
|------|-------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |       |      |       | ویژگی                                                                   |
| ۳۹   | ۲۶    | ۴۵   | ۲۸    | شمار نوترون‌ها در هستهٔ اتم                                             |
| ۱/۵  | ۲     | ۳/۵  | ۳     | نسبت شمار الکترون‌های ظرفیتی به شمار الکترون‌های لایهٔ اول الکترونی اتم |
| اصلی | واسطه | اصلی | واسطه | نوع عنصر                                                                |

- (۱) عدد جرمی عنصر A برابر ۵۲ است؛ میان عنصرهای E و M در جدول تناوبی، ۸ عنصر فلزی جای دارد.
- (۲) شعاع اتمی عنصر E از عنصر M بزرگ‌تر و تفاوت شمار نوترون‌ها و پروتون‌ها در اتم عنصر D، برابر ۱۲ است.
- (۳) A و M در ترکیب‌های خود، به صورت کاتیون  $3+$  وجود دارند؛ عنصر D، با هیدروژن در دمای اتاق واکنش می‌دهد.
- (۴) آرایش الکترونی اتم عنصر A، از قاعدهٔ آفبا پیروی نمی‌کند؛ شمار الکترون‌ها با  $l = 2$  در اتم عناصر D و E، برابر است.

## تست ۱۹ – سراسری تجربی داخل ۱۴۰۰

در یون فلزی  ${}^{65}\text{M}^{2+}$  تفاوت شمار پروتون‌ها و نوترون‌ها برابر ۷ است. کدام موارد از مطالب زیر، دربارهٔ عنصر M درست است؟  
الف) اتم آن دارای ۸ الکترون با عدد کوانتومی  $l = 0$  است.

ب) عنصری از گروه ۱۱ در دورهٔ چهارم جدول تناوبی با عدد اتمی ۲۹ است.

پ) شمار الکترون‌های دارای  $l = 1$  در اتم آن،  $1/2$  برابر شمار الکترون‌های دارای  $l = 2$  است.

ت) شمار الکترون‌های آخرین لایهٔ اشغال‌شدهٔ اتم آن با شمار الکترون‌های آخرین لایهٔ اشغال‌شدهٔ اتم  $X$  ۲۵ برابر است.

(۱) الف - ت

(۲) الف - پ

(۳) ب - پ

(۴) ب - ت

## تست ۲۰ – سراسری تجربی داخل ۱۴۰۰

$\frac{2}{7}$  جرم اکسید  $X_2O_3$  را اکسیژن تشکیل می‌دهد. جرم اتمی عنصر  $X$  چند amu است و در صورتی که تفاوت شمار پروتون‌ها و نوترون‌های اتم آن برابر ۶ باشد، عنصر  $X$  در کدام دوره جدول تناوبی جای دارد؟ (عدد جرمی را برابر جرم اتمی در نظر بگیرید،  $O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ )

(۱) ۶۰ ، چهارم

(۲) ۶۰ ، پنجم

(۳) ۷۰ ، چهارم

(۴) ۷۰ ، پنجم

## تست ۲۱ - سراسری تجربی خاړچ ۱۴۰۰

باتوجه به داده‌های جدول زیر، کدام مطالب درست است؟ (عنصرهای  $X$ ،  $E$ ،  $D$  و  $A$  در دورهٔ چهارم جدول تناوبی جای دارند)

| یون‌ها |                      |                      |          | ویژگی‌ها                                                    | ردیف |
|--------|----------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|
| $A^-$  | ${}^{29}_{29}D^{2+}$ | ${}^{33}_{33}E^{3-}$ | $X^{3+}$ |                                                             |      |
| ۸      | ۱۷                   | ۸                    | ۱۴       | شمار الکترون‌های آخرین لایهٔ اشغال‌شده                      | ۱    |
| ۱۰     | b                    | a                    | ۶        | شمار الکترون‌های دارای عدد کوانتومی $l = 2$                 | ۲    |
| ۲/۲۵   | ۲                    | ۲/۲۵                 | ۲        | نسبت شمار الکترون‌های دارای عدد کوانتومی $l = 1$ به $l = 0$ | ۳    |

- عدد اتمی عنصر  $A$ ، برابر مجموع عددهای ردیف دوم جدول است.
- تفاوت عدد اتمی عنصر  $X$  با فلز قلیایی هم‌دوره‌اش، برابر ۸ است.
- عنصر  $E$  در واکنش با عنصر  $M$ ، ترکیبی با فرمول شیمیایی  $ME$  تشکیل می‌دهد.
- بار کاتیون  $D$  در ترکیب‌هایش، همانند بار کاتیون عنصر ۳۱ جدول تناوبی در ترکیب‌هایش است.

(۲) ۲

(۱) ۱

(۴) ۴

(۳) ۳

## تست ۲۲ – سراسری تجربی خارج ۱۴۰۰

- دربارهٔ عنصر  $^{34}_{16}\text{X}$  در جدول تناوبی، چند مورد از مطالب زیر درست است؟
- خواص شیمیایی آن، مشابه خواص شیمیایی شانزدهمین عنصر جدول تناوبی است.
  - شمار الکترون‌های دارای  $l = 1$  اتم آن، دو برابر شمار الکترون‌های دارای  $l = 0$  است.
  - شمار الکترون‌های ظرفیتی اتم آن، با شمار الکترون‌های ظرفیتی اتم  $^{24}_{24}\text{Cr}$  برابر است.
  - با یکی از عنصرهای گازی جدول، هم‌گروه و با یکی از عنصرهای مایع جدول، هم‌دوره است.

(۲) ۲

(۱) ۱

(۴) ۴

(۳) ۳

## تست ۲۳ – سراسری تجربی خا رج ۱۴۰۰

با کدام گزینه‌ها، مفهوم علمی جمله زیر به‌درستی کامل می‌شود؟

"در میان عنصرهای واسطه دوره چهارم جدول تناوبی، دو عنصر وجود دارند که در اتم آن‌ها ....."

(الف) ۱۰ الکترون، عددهای کوانتومی  $n = 3$  و  $l = 2$  دارند.

(ب) یک الکترون، عددهای کوانتومی  $n = 3$  و  $l = 0$  دارد.

(پ) در آخرین لایه الکترونی، تنها یک الکترون وجود دارد.

(ت) ۱۲ الکترون، عددهای کوانتومی  $n = 3$  و  $l = 1$  دارند.

(۱) الف - ب

(۲) پ - ت

(۳) الف - پ

(۴) ب - ت

## تست ۲۴ – سراسری تجربی داخل ۱۴۰۱

با مشخص شدن جایگاه یک عنصر در جدول تناوبی، چند مورد از مفاهیم زیر برای آن عنصر مشخص می‌شود؟

- شماره گروه - شماره دوره - شمار ایزوتوپ
- عدد اتمی - عدد جرمی - شمار پروتون‌ها و الکترون‌های اتم
- شمار نوترون‌های اتم - زیرلایه در حال پر شدن اتم

(۱) ۶

(۲) ۵

(۳) ۴

(۴) ۳

## تست ۲۵ – سراسری تجربی داخل ۱۴۰۱

در یک نمونه سدیم نیتريد، مجموع شمار يون‌ها برابر  $10^{24} \times 612/3$  است. از واكنش آن با مقدار كافى آب، چند ليتر گاز آمونياك (در شرايط STP) و چند گرم سدیم هيدروكسيد تشكيل مى‌شود؟ ( $H = 1$  ,  $O = 16$  ,  $Na = 23$  :  $g.mol^{-1}$ )

(۲) ۱۲۰ ، ۴۴/۸

(۱) ۱۸۰ ، ۴۴/۸

(۴) ۱۸۰ ، ۳۳/۶

(۳) ۱۲۰ ، ۳۳/۶

## تست ۲۶ – سراسری تجربی داخل ۱۴۰۱

دربارهٔ عنصری که اتم آن دارای ۱۰ الکترون با عدد کوانتومی  $n = ۳$  و  $l = ۲$  و ۷ الکترون با عدد کوانتومی  $l = ۰$  است چند مورد از مطالب زیر درست می‌باشد؟

- در گروه ۹ جدول تناوبی جای دارد.
- در دورهٔ چهارم جدول تناوبی جای دارد و از فلزهای واسطهٔ دستهٔ d است.
- شمار الکترون‌های دارای  $l = ۱$  اتم آن با شمار همین الکترون‌ها در اتم  $^{۲۲}\text{Ti}$ ، برابر است.
- شمار الکترون‌های آخرین زیرلایهٔ اشغال‌شدهٔ اتم آن،  $\frac{۱}{۳}$  شمار الکترون‌های ظرفیتی عنصر ۲۱ جدول تناوبی است.

(۲) ۳

(۱) ۴

(۴) ۱

(۳) ۲

## تست ۲۷ – سراسری تجربی داخل ۱۴۰۱

از عنصرهای ۱ تا ۳۶ جدول تناوبی، چند عنصر در آخرین زیرلایه اشغال شده اتم خود، تنها یک الکترون دارند؟

(۱) ۹

(۲) ۱۰

(۳) ۱۲

(۴) ۱۳

## تست ۲۸ – سراسری تجربی خارج ۱۴۰۱

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

- $n + l$  برای زیرلایه  $4d$ ، دو برابر  $n + l$  برای زیرلایه  $3s$ ، است.
- تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها، در یون  ${}^{140}_{58}\text{Z}^{3+}$ ، برابر ۳۰ است.
- در اتم  ${}^{26}\text{D}$ ، سه زیرلایه وجود دارد که هریک با شش الکترون اشغال شده‌اند.
- شمار الکترون‌های ظرفیت اتم  ${}^{33}\text{A}$  با شمار الکترون‌های ظرفیت اتم  ${}^{24}\text{X}$ ، برابر است.
- زیرلایه  $4s$ ، پیش از زیرلایه  $3d$  در اتم عنصرهای واسطه دوره چهارم جدول تناوبی از الکترون اشغال می‌شود.

(۲) ۳

(۱) ۲

(۴) ۵

(۳) ۴

## تست ۲۹ - سراسری تجربی خارج ۱۴۰۱


باتوجه به شکل زیر، لایه های الکترونی اشغال شده اتم عنصر A و شمار الکترون های دو لایه آخر آن را نشان می دهد، کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟

الف) عدد اتمی این عنصر، برابر ۲۸ است.

ب) زیرلایه ای با  $l = 2$  در اتم آن، ۱۰ الکترون دارد.

پ) همه زیرلایه های اشغال شده اتم آن پر از الکترون اند.

ت) این عنصر، در دوره چهارم و گروه ۱۰ جدول دوره ای جای دارد.



لایه های الکترونی اتم عنصر A

(۱) الف - ب

(۲) الف - ت

(۳) ب - پ

(۴) پ - ت

## تست ۳۰ - سراسری تجربی خارج ۱۴۰۱

چند مورد از مطالب زیر درست است؟ ( $\text{H} = 1$  ,  $\text{C} = 12$  ,  $\text{O} = 16$  ,  $\text{Fe} = 56$  ,  $\text{Cu} = 64$  :  $\text{g.mol}^{-1}$ )  
-  $10^{19} \times 1/806$  اتم مس،  $1/92$  میلی گرم جرم دارد.

- شمار مول ها در ۸ گرم مس، با شمار مول ها در ۷ گرم آهن برابر است.

- عدد جرمی هر عنصر، همان جرم مشخص شده آن در جدول دوره های عناصر است.

- شمار اتم ها در ۲ گرم آب خالص، از شمار اتم ها در ۱ گرم کربن دی اکسید بیشتر است.

- اتم  $^{31}_{\text{Ga}}$  می تواند مانند اتم  $^{21}_{\text{Sc}}$ ، کاتیونی با سه بار مثبت، با آرایش هشت تایی تشکیل دهد.

(۲) ۴

(۱) ۵

(۴) ۲

(۳) ۳